

**DOVOLJENJE**  
**ZARAZŠIRITEV UPORABE**  
**FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA**  
**TELDOR SC 500**

- 1 I. Navedenim pridelovalcem, *se dovoli* v Republiki Sloveniji razširitev uporabe fitofarmacevtskega sredstva **TELDOR SC 500 (fenheksamid 50%) za uporabo na ameriških borovnicah:**
  - 0 1. Kmetijski inštitut Slovenije, Poskusni nasad Brdo pri Lukovici, 1225 Lukovica;
  - 1 2. Palčič Anton, Pot v Jele 5, 1353 Borovnica;
  - 2 3. Rot Ivan, Zalarjeva ulica 56, 1353 Borovnica;
  - 3 4. Pristavec Jernej, Pot v Jele 8, 1353 Borovnica;
  - 4 5. Suhadolnik Matija, Zalarjeva ulica 26, 1353 Borovnica;
  - 5 6. Suhadolnik Franc, Cesta na grič NH, 1353 Borovnica;
  - 6 7. Pirc Jože, Dol pri borovnici 68, 1353 Borovnica;
  - 7 8. Kržič Marjan, Pako 31, 1353 Borovnica;
  - 8 9. Leben Jure, Cesta na grič 46, 1353 Borovnica;
  - 9 10. Kržič Mitja, Lesno Brdo 18, 1360 Vrhnika;
  - 10 11. Varšek Anton, V zatišju 7, 1360 Vrhnika;
  - 11 12. Lavrinc Miran, Drenov Grič 139, 1360 Vrhnika.
- 2 II. Fitofarmacevtsko sredstvo proizvajalca Bayer CropScience AG, Monheim, Nemčija, ki ga zastopa Bayer CropScience d.o.o., Ljubljana, TELDOR SC 500 je registrirano v Republiki Sloveniji z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, št. 327-02-250/2003/9 z dne, 10.06.2004, ki velja do dne
  - 1 10.06.2014, za uporabo na vinski trti, jagodah, češnjah, slivah, češpljah, breskvah, malinah, robidah, ribezu, kosmuljah, brusnicah, paradižniku in okrasnih rastlinah.
- 2 III. Uporaba navedenega fitofarmacevtskega sredstva na ameriških borovnicah mora potekati pod pogoji pod katerimi je bilo v Republiki Sloveniji registrirano fitofarmacevtsko sredstvo TELDOR SC 500 in dodatnimi pogoji:

»**UPORABA:** TELDOR SC 500 se uporablja ameriških borovnicah za zatiranje **sive plesni (*Botryotinia fuckeliana*)** v odmerku 2 L/ha.

Tretira se lahko največ štirikrat, vsakič v odmerku 2 L/ha, in sicer: pred cvetenjem, v času cvetenja, med cvetenjem in po cvetenju.

**OPOZORILA:** Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporablja največ štirikrat v eni rastni sezoni.

**KARENCA:** Karenca za ameriške borovnice je 7 dni.

**DOVOLJENJE**  
**ZARAZŠIRITEV UPORABE**  
**FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA**  
**CHAMPION WP 50**

- 1 I. Navedenim pridelovalcem, *se dovoli* v Republiki Sloveniji razširitev uporabe fitofarmacevtskega sredstva **CHAMPION WP 50** (baker v obliki bakrovega hidroksida 50%) *za uporabo na ameriških borovnicah*:
  - 0 1. Kmetijski inštitut Slovenije, Poskusni nasad Brdo pri Lukovici, 1225 Lukovica;
  - 1 2. Palčič Anton, Pot v Jele 5, 1353 Borovnica;
  - 2 3. Rot Ivan, Zalarjeva ulica 56, 1353 Borovnica;
  - 3 4. Pristavec Jernej, Pot v Jele 8, 1353 Borovnica;
  - 4 5. Suhadolnik Matija, Zalarjeva ulica 26, 1353 Borovnica;
  - 5 6. Suhadolnik Franc, Cesta na grič NH, 1353 Borovnica;
  - 6 7. Pirc Jože, Dol pri borovnici 68, 1353 Borovnica;
  - 7 8. Kržič Marjan, Pako 31, 1353 Borovnica;
  - 8 9. Leben Jure, Cesta na grič 46, 1353 Borovnica;
  - 9 10. Kržič Mitja, Lesno Brdo 18, 1360 Vrhnika;
  - 10 11. Varšek Anton, V zatišju 7, 1360 Vrhnika;
  - 11 12. Lavrinc Miran, Drenov Grič 139, 1360 Vrhnika.
- 2 II. Fitofarmacevtsko sredstvo proizvajalca Nu Farm GmbH&Co KG, Linz, Avstrija, ki ga zastopa Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, CHAMPION WP 50 je registrirano v Republiki Sloveniji z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, št. 327-02-25/00 z dne, 27.02.2003, ki velja do dne 23.12.2012, za uporabo na vinski trti, jablanah, hruškah, hmelju, čebuli, fižolu, kumarah, krompirju, paradižniku in koščičastem sadnem drevju.
- 1 III. Uporaba navedenega fitofarmacevtskega sredstva na ameriških borovnicah mora potekati pod pogoji pod katerimi je bilo v Republiki Sloveniji registrirano fitofarmacevtsko sredstvo CHAMPION WP 50 in dodatnimi pogoji:

»**UPORABA:** CHAMPION WP 50 se uporablja na **ameriških borovnicah** za zatiranje **bolezni lesa – odmiranja stebel (*Fusicoccum putrefaciens*)** in **sušenja vej (*Phomopsis vaccinii*)**. Ameriške borovnice se tretira dvakrat v času mirovanja (jeseni in spomladi) v 0,25 % koncentraciji ali v odmerku 0,75 kg/ha ob uporabi vode 300 L/ha.

**OPOZORILA:** Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporablja največ dvakrat v eni rastni sezoni.

**KARENCA:** Karenca za ameriške borovnice je zagotovljena s časom uporabe.

**DOVOLJENJE  
ZARAZŠIRITEV UPORABE  
FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA  
FOLICUR 250 EW**

I. Clanom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije **se dovoli** razširitev uporabe fitofarmacevtskega sredstva **FOLICUR 250 EW** (*tebukonazol* 250 g/L) za uporabo na

**ameriških borovnicah** v Republiki Sloveniji.

II. Fitofarmacevtsko sredstvo FOLICUR 250 EW, proizvajalca Bayer Crop Science AG, Monheim, Nemcija, ki ga zastopa Bayer d.o.o., Bravnicarjeva 13, Ljubljana, je registrirano

v Republiki Sloveniji z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, št. SFS 7021 z dne, 10.02.1997, ki je bila spremenjena z odločbama

št. 327-02-173/2003 z dne, 19.06.2003, ter 327-02-46/2004/5 z dne, 30.10.2008, in je

registrirano za uporabo na pšenici, jecmenu, rži, ovsu, oljni ogrščici in vinski trti.

III. Uporaba navedenega fitofarmacevtskega sredstva na ameriških borovnicah mora potekati pod

pogoji pod katerimi je bilo v Republiki Sloveniji registrirano fitofarmacevtsko sredstvo

FOLICUR 250 EW in dodatnimi pogoji:

»UPORABA: FOLICUR 250 EW se uporablja za zatiranje primarnih okužb **cvetne monilije (*Monilinia***

***vaccinii-corymbosi*)** na **ameriških borovnicah** v odmerku 0,8 L/ha, ob porabi vode 1000 L/ha. Tretira se

pred cvetenjem, v času odpiranja brstov (BBCH 55).

OPOZORILA: Sredstvo se sme na istem zemljišču uporabiti samo en krat v eni rastni sezoni. Za delavca

je obvezna uporaba osebne zaščitne opreme. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov,

vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme

tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. Delovna karenca znaša 7 dni.